



Palladio

Festuca arundinacea - Turf Type Tall fescue

Η **Palladio** είναι μια ποικιλία φεστούκας του οίκου Barenbrug με σκούρο πράσινο χρώμα. Η **Palladio** έχει ευρεία προσαρμογή σε διάφορες χρήσεις χλοοτάπητα λόγω των άριστων χαρακτηριστικών της τα οποία είναι :

- **Καταπληκτικό βαθυπράσινο χρώμα**
- Άριστη πυκνότητα χλοοτάπητα.
- Υψηλή ταχύτητα κάλυψης.
- Καλή υφή φύλλου.
- Εξαιρετική αντοχή στη φθορά.
- Υψηλή αντοχή στα άλατα.
- Καλή συμπεριφορά σε μεσογειακές κλιματικές συνθήκες όπως της Ελλάδας.
- Άριστη αντοχή στον μύκητα leaf spot(Ελμινθοσπόριο).
- Υψηλή αντοχή στον μύκητα brown patch(Ριζοκτόνια).
- Ανεκτικότητα στο χαμηλό κούρεμα (25-30mm).
- Εξαιρετική αντοχή στην ξηρασία.
- Κατάλληλο για ανάμιξη με *Poa pratensis* ή Bermuda grass.

Που χρησιμοποιείται η **Palladio**

Λόγω των εξαιρετικών χαρακτηριστικών της **Palladio**, η ποικιλία αυτή είναι κατάλληλη για μια ευρεία γκάμα χρήσεων. Η **Palladio** συνιστάται για όλων των ειδών τα γήπεδα, πάρκα και πολλές εφαρμογές αρχιτεκτονικής τοπίου.

Η **Palladio** ανέχεται την σκιά και ακόμα είναι ανεκτική στο πότισμα με νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε Cl.

Σπορά

45 – 50 γραμμάρια / τ.μ.

Η **Palladio** αναμιγνύεται πολύ καλά με Kentucky bluegrass (*Poa pratensis*) ή με Bermuda grass (*Cynodon dactylon*) σε ποσοστό 43γρ. **Palladio** + 7γρ. *Poa pratensis* ή Bermuda grass ανά τ.μ. Τα μίγματα αυτά δίδουν ένα δυνατό και πυκνό χλοοτάπητα ανθεκτικό στην παρατεταμένη χρήση.



Λίπανση

Οι φεστούκες αντιδρούν πολύ καλά σε λίπανση 5 – 7,5 γραμμαρίων αζώτου / τ.μ. . Κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης η λίπανση μπορεί να επαναληφθεί 2 φορές. Το Φθινόπωρο όταν η ανάπτυξη του φυλλώματος έχει σταματήσει, είναι σημαντικό να προσθέσουμε ένα πλήρες λίπασμα, κατά προτίμηση μικρόκοκκο και βραδείας αποδέσμευσης, ώστε να έχουμε χρώμα και αντοχή το χειμώνα και καλό ξεκίνημα την επόμενη χρονιά.

Πότισμα

α) Μετά τη σπορά: Ομαλό πότισμα έως τέσσερις φορές την ημέρα έτσι ώστε το χόμα να είναι συνεχώς βρεγμένο, μέχρι ο σπόρος να βλαστήσει.

β) Μετά την εγκατάσταση: Πότισμα μόνο όταν το γκαζόν δείχνει σημεία μαρανσης. Αποφεύγουμε το καθημερινό πότισμα! Πότισμα κάθε 2 – 3 ημέρες με μεγάλη ποσότητα νερού έτσι ώστε να έχουμε βαθιά εισχώρηση του νερού για καλύτερη ανάπτυξη σε βάθος του ριζικού συστήματος. Όλα τα ποτίσματα πρέπει να γίνονται νωρίς το πρωί έτσι ώστε να αποφευχθούν προβλήματα ασθενειών Brown patch και Leafspot (Ριζοκτόνια και Ελμυθοσπόριο).

Συγκριτικός πίνακας του Γαλλικού προγράμματος αξιολόγησης χλοοτάπητα GEVES (Groupe d'Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences) και για ποικιλίες Festuca arundinacea.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ GEVES								
Ποικιλία	Αθλοπαιδιές	Χρώμα	Πυκνότητα	Καταπόνηση	Αντοχή στο ελμυθοσπόριο	Αντοχή στην σκωρίαση	Ανταγωνιστική συμπεριφορά	Ταχύτητα εγκατάστασης
Palladio	6.4	7.3	7.5	6.1	7.6	7.8	7.8	7.4
Tomahawk	5.9	7.3	6.6	5.8	7.9	7.0	6.9	7.4
Olympic Gold	5.9	7.3	6.9	5.7	7.3	7.8	7.8	6.8
Barnoble	6.4	6.0	6.9	6.4	7.7	8.6	7.4	7.2
Barleroy	6.4	6.4	7.7	6.8	6.9	7.4	7.6	7.3
Barleduc	6.2	6.3	8.0	6.7	7.9	7.6	6.3	5.6
Eldorado	6.0	7.6	7.4	6.7	6.6	7.7	7.4	6.1
Tulsa	5.8	7.2	8.1	6.3	7.4	7.8	7.3	5.5
Cochise	5.9	7.2	7.4	6.5	7.4	7.7	6.6	6.2

F.A. PALLADIO

«Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ ΦΕΣΤΟΥΚΑ»